ADKA-if-RKI Antiinfektiva-Surveillance

6. Krankenhausvergleichs-Report

Antimykotika

2013/2014

Nur zum internen Gebrauch!

ROBERT KOCH INSTITUT

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,

als Ergänzung zum im Juni bereitgestellten 6. Krankenhausvergleichsreport 2013/2014 finden Sie auf den folgenden Seiten eine zusätzliche Auswertung der Antimykotika.

Auch hier sind die kumulierten Verbrauchsdaten der **jüngsten vier Quartale** aus dem Zeitraum **2013 bis 2014** der teilnehmenden Krankenhäuser eingeflossen, die für diesen Zeitraum Daten über Ihren Antimykotikaverbrauch geliefert haben.

In der hier präsentierten Ergänzung zum KH-Vergleichsreport 2013/2014 sind die Antimykotikadaten von 124 Krankenhäusern im Vergleich dargestellt.

Auf den ersten Seiten finden Sie die Ergebnisse für das Krankenhaus gesamt, nach Bettengrößenklasse sortiert.

Die Zuordnung der Fachabteilungen in diesem Report ist identisch mit der Zuordnung im bereits bereitgestellten Report über den Antibiotikaverbrauch und entnehmen Sie bitte auch Tabelle 1.

Die Daten sind auch hier in RDD/100 kalkuliert.

Sollten Ihre Daten noch nicht mit in diese Auswertung eingeflossen sein, so können Sie diesen Report dennoch für Ihre eigene Klinik nutzen! Nehmen Sie in diesem Fall Ihren eigenen krankenhausinternen Antiinfektiva-Report zur Hand. Mit Hilfe des Vergleichsreports ist es Ihnen so möglich, eine persönliche Einordnung Ihrer Daten in Relation zu anderen Krankenhäusern vorzunehmen.

gez.

Prof. Dr. Winfried V. Kern,
Michaela Steib-Bauert,
Dr. Gesche Först

Abteilung Infektiologie
Universitätsklinikum
Freiburg

Dr. Matthias Fellhauer
Sprecher
ADKA-Ausschuss Antiinfektive Therapie

Dr. Dr. Katja de With
Sprecherin
DGI-Sektion Antibiotic Stewardship

September 2015

Aufbau und Systematik des Vergleichsreports

Der Report beinhaltet die Daten von 124 Akutkliniken, die additiv zu Ihren Antiobiotika- auch Ihre Antimykotikaverbrauchsdaten geliefert haben. Diese 124 Krankenhäuser bieten eine breite und repräsentative Krankenhausstruktur. 66 Krankenhäuser sind in der Gruppe mit <400 Betten, 23 Krankenhäuser in der Gruppe mit 400-800 Betten und 26 Krankenhäuser in der Gruppe >800 Betten (darunter sind 12 Universitätskliniken, die in den Graphiken jeweils mit einem Sternchen gekennzeichnet sind).

Die Verbrauchsdaten wurden jeweils sowohl für die Gesamtkliniken, wie auch für je elf einzelne Fachbereiche, ggf. getrennt nach Normal- und Intensivstationen dargestellt. Psychiatrische und pädiatrische Stationen und Abteilungen sind wie bisher nicht berücksichtigt worden!

Die Zusammensetzung der ausgewerteten Bereiche können Sie der nachfolgenden Tabelle entnehmen.

Tabelle 1: Zuordnung der Fachabteilungen zu Auswertungsbereichen des Vergleichsreports

Ausgewerteter Bereich in Report	Fachabteilung/Fachbereiche
Chirurgische Normalstationen	Normalstationen Allgemein- und Viszeralchirurgie, Unfallchirurgie, Herz- und Gefäßchirurgie, Thoraxchirurgie, Plastische-, Hand- und Verbrennungschirurgie, Neurochirurgie
Urologie	Normalstationen Urologie
Orthopädie/Traumatologie	Normalstationen Orthopädie und Traumatologie
Sonstige operative/interdisziplinäre Normalstationen	Normalstationen Gynäkologie, Augenheilkunde, HNO, Dermatologie, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, sowie interdisziplinäre Normalstationen
Hämatologie/Onkologie	Internistische Hämatologie-Onkologie und Stammzelltransplantation
Internistische Normalstationen	Normalstationen Allgemeine Innere Medizin, Nephrologie, Pneumologie, Gastroenterologie/Hepatologie, Endokrinologie/Diabetologie, Infektiologie, Rheumatologie/Immunologie, Kardiologie/Angiologie
Sonstige nicht-operative Normalstationen	Normalstationen Neurologie, Strahlentherapie, Nuklearmedizin
Internistische Intensivmedizin	Intensivstationen Innere Medizin incl. Kardiologie
Andere nicht-operative Intensivstationen	Intensivstationen Neurologie
Anästhesiologische und chirurgische Intensivmedizin	Anästhesiologische und chirurgische Intensiv- und Wachstationen
Andere operative/interdisziplinäre Intensivmedizin	Intensivstationen Urologie, Gynäkologie, sowie interdisziplinäre Intensivstationen

Die Antimykotika wurden als Gesamtverbrauch und getrennt nach folgenden Wirkstoffen ausgewertet:

- Amphotericin B gesamt
  - Amphotericin B konventionell
  - Amphotericin B liposomal
- Anidulafungin
- Caspofungin

- Micafungin
- Flucytosin
- Fluconazol
- Itraconazol
- Ketoconazol
- Posaconazol
- Voriconazol
- Terbinafin

Die Antimykotikverbräuche sind jeweils in RDD/100 Pflegetage angegeben. Die Definition (und ggf. Abweichung zu WHO-DDD) ersehen Sie in folgender Tabelle:

	RDD	WHO-DDD
Amphotericin B konventionell	0,05	0,035
Amphotericin B liposomal	0,25	0,25
Anidulafungin	0,10	0,10
Caspofungin	0,05	0,05
Micafungin	0,10	0,10
Flucytosin	10,00	10,00
Fluconazol	0,40	0,20
Itraconazol	0,40	0,20
Ketoconazol	0,40	0,20
Posaconazol	0,80	0,80
Voriconazol	0,40	0,40
Terbinafin	0,25	0,25

Die Darstellung der Daten im Report erfolgt, wie schon im präsentierten Antibiotikareport anhand von Übersichtsgrafiken und Verteilungstabellen.

Die Abbildungen zeigen die Verbrauchsdichten der einzelnen Substanzklassen als Anteile am Gesamtverbrauch. In den Verteilungstabellen sind jeweils der Median, sowie die Interquartilbereiche der RDD/100 für Antimykotika gesamt und die oben aufgeführten Wirkstoffe dargestellt. Die Interquartilbereiche kennzeichnen die Verbrauchsdichten der mittleren 50 % aller in die Analyse eingeschlossenen Krankenhäuser (25%-75%).

Anhand dieser Werte lässt sich sehr einfach einordnen, wie hoch der eigene Antimykotikaverbrauch in Relation zu anderen Kliniken der eigenen Bettengrößenklasse ist.

Krankenhaus gesamt,
< 400 Betten



Krankenhaus gesamt,
400 - 800 Betten



Krankenhaus gesamt,
> 800 Betten



Krankenhaus gesamt:
Mittlerer Antimykotikaverbrauch in Tagesdosen pro 100 Pflegetage (RDD/100).

	<400 Betten		400-800 Betten		> 800 Betten	
	Median	Interquartil-bereich	Median	Interquartil-bereich	Median	Interquartil-bereich
Antimykotika gesamt	0,3	0,2 - 0,7	0,7	0,4 - 1,0	2,7	1,2 - 4,5
Amphotericin B gesamt	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,1	0,0 - 0,3
Amphotericin B konservativ	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Amphotericin B liposomal	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,1	0,0 - 0,3
Anidulafungin	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,1
Caspofungin	0,0	0,0 - 0,1	0,1	0,0 - 0,2	0,4	0,2 - 0,6
Fluconazol	0,2	0,1 - 0,4	0,4	0,2 - 0,5	1,0	0,5 - 1,9
Flucytosin	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Itraconazol	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Ketoconazol	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Micafungin	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,1
Posaconazol	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,1	0,2	0,1 - 0,6
Terbinafin	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Voriconazol	0,0	0,0 - 0,0	0,1	0,0 - 0,1	0,4	0,1 - 0,6

Chirurgische Normalstationen, < 400 Betten



Chirurgische Normalstationen, 400 - 800 Betten



Chirurgische Normalstationen, > 800 Betten



Chirurgische Normalstationen:
Mittlerer Antimykotikaverbrauch in Tagesdosen pro 100 Pflegetage (RDD/100).

	<400 Betten		400-800 Betten		> 800 Betten	
	Median	Interquartil-bereich	Median	Interquartil-bereich	Median	Interquartil-bereich
Antimykotika gesamt	0,1	0,0 - 0,2	0,2	0,1 - 0,3	0,7	0,5 - 1,5
Amphotericin B gesamt	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Amphotericin B konservativ	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Amphotericin B liposomal	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Anidulafungin	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,1
Caspofungin	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,1	0,0 - 0,2
Fluconazol	0,1	0,0 - 0,2	0,1	0,1 - 0,2	0,4	0,2 - 0,9
Flucytosin	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Itraconazol	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Ketoconazol	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Micafungin	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Posaconazol	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Terbinafin	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Voriconazol	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,1	0,0 - 0,1

Urologie,
< 400 Betten / 400-800 Betten



Urologie,
> 800 Betten



Urologie:
Mittlerer Antimykotikaverbrauch in Tagesdosen pro 100 Pflegetage (RDD/100).

	<400 Betten		400-800 Betten		> 800 Betten	
	Median	Interquartil-bereich	Median	Interquartil-bereich	Median	Interquartil-bereich
Antimykotika gesamt	0,1	0,0 - 0,4	0,4	0,2 - 0,6	0,7	0,3 - 1,1
Amphotericin B gesamt	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Amphotericin B konservativ	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Amphotericin B liposomal	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Anidulafungin	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Caspofungin	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,1
Fluconazol	0,1	0,0 - 0,4	0,3	0,1 - 0,6	0,7	0,2 - 0,9
Flucytosin	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Itraconazol	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Ketoconazol	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Micafungin	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Posaconazol	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Terbinafin	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Voriconazol	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0

Orthopädie / Traumatologie,
< 400 Betten / 400 – 800 Betten / > 800 Betten



Orthopädie/Traumatologie:
Mittlerer Antimykotikaverbrauch in Tagesdosen pro 100 Pflegetage (RDD/100).

	<400 Betten		400-800 Betten		> 800 Betten	
	Median	Interquartil-bereich	Median	Interquartil-bereich	Median	Interquartil-bereich
Antimykotika gesamt	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,4	0,1 - 0,6
Amphotericin B gesamt	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Amphotericin B konservativ	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Amphotericin B liposomal	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Anidulafungin	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Caspofungin	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Fluconazol	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,2	0,1 - 0,5
Flucytosin	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Itraconazol	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Ketoconazol	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Micafungin	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Posaconazol	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Terbinafin	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Voriconazol	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0

Sonstige operative / interdisziplinäre Normalstationen, < 400 Betten



Sonstige operative / interdisziplinäre Normalstationen, 400 - 800 Betten



Sonstige operative / interdisziplinäre Normalstationen, > 800 Betten



Sonstige operative/interdisziplinäre Normalstationen:
Mittlerer Antimykotikaverbrauch in Tagesdosen pro 100 Pflegetage (RDD/100).

	<400 Betten		400-800 Betten		> 800 Betten	
	Median	Interquartil-bereich	Median	Interquartil-bereich	Median	Interquartil-bereich
Antimykotika gesamt	0,1	0,0 - 0,4	0,2	0,1 - 0,3	0,3	0,2 - 0,5
Amphotericin B gesamt	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Amphotericin B konservativ	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Amphotericin B liposomal	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Anidulafungin	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Caspofungin	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Fluconazol	0,1	0,0 - 0,3	0,1	0,1 - 0,2	0,1	0,1 - 0,3
Flucytosin	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Itraconazol	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Ketoconazol	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Micafungin	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Posaconazol	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Terbinafin	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Voriconazol	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,1

Hämatologie / Onkologie,
< 400 Betten / 400-800 Betten



Hämatologie / Onkologie,
> 800 Betten



Hämatologie/Onkologie:
Mittlerer Antimykotikaverbrauch in Tagesdosen pro 100 Pflegetage (RDD/100).

	<400 Betten		400-800 Betten		> 800 Betten	
	Median	Interquartil-bereich	Median	Interquartil-bereich	Median	Interquartil-bereich
Antimykotika gesamt	2,1	1,1 - 3,0	2,6	1,9 - 7,2	23,6	7,5 - 38,7
Amphotericin B gesamt	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	1,7	0,0 - 3,5
Amphotericin B konservativ	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Amphotericin B liposomal	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	1,7	0,0 - 3,5
Anidulafungin	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,1	0,0	0,0 - 0,1
Caspofungin	0,0	0,0 - 0,2	0,1	0,0 - 0,7	1,8	0,6 - 3,9
Fluconazol	1,0	0,3 - 1,7	1,7	0,5 - 1,8	2,9	1,3 - 8,7
Flucytosin	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Itraconazol	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Ketoconazol	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Micafungin	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,7
Posaconazol	0,0	0,0 - 0,2	0,4	0,0 - 1,7	5,6	1,8 - 9,2
Terbinafin	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Voriconazol	0,2	0,0 - 1,1	0,4	0,1 - 0,6	3,2	1,1 - 6,5

Internistische Normalstationen, < 400 Betten



Internistische Normalstationen, 400 - 800 Betten



Internistische Normalstationen, > 800 Betten



Internistische Normalstationen:
Mittlerer Antimykotikaverbrauch in Tagesdosen pro 100 Pflegetage (RDD/100).

	<400 Betten		400-800 Betten		> 800 Betten	
	Median	Interquartil-bereich	Median	Interquartil-bereich	Median	Interquartil-bereich
Antimykotika gesamt	0,2	0,1 - 0,5	0,4	0,2 - 0,6	1,1	0,3 - 2,3
Amphotericin B gesamt	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,1
Amphotericin B konservativ	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Amphotericin B liposomal	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Anidulafungin	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Caspofungin	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,1	0,0 - 0,2
Fluconazol	0,2	0,1 - 0,4	0,2	0,1 - 0,4	0,6	0,2 - 1,2
Flucytosin	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Itraconazol	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Ketoconazol	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Micafungin	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Posaconazol	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,1
Terbinafin	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Voriconazol	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,1	0,1	0,0 - 0,2

Sonstige nicht-operative Normalstationen, < 400 Betten / 400 – 800 Betten



Sonstige nicht-operative Normalstationen, > 800 Betten



Sonstige nicht-operative Normalstationen:
Mittlerer Antimykotikaverbrauch in Tagesdosen pro 100 Pflegetage (RDD/100).

	<400 Betten		400-800 Betten		> 800 Betten	
	Median	Interquartil-bereich	Median	Interquartil-bereich	Median	Interquartil-bereich
Antimykotika gesamt	0,1	0,0 - 0,2	0,2	0,1 - 0,3	0,3	0,1 - 0,9
Amphotericin B gesamt	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Amphotericin B konservativ	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Amphotericin B liposomal	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Anidulafungin	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Caspofungin	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Fluconazol	0,1	0,0 - 0,2	0,1	0,0 - 0,3	0,3	0,1 - 0,8
Flucytosin	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Itraconazol	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Ketoconazol	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Micafungin	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Posaconazol	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Terbinafin	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Voriconazol	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,1

Internistische Intensivmedizin,
< 400 Betten / 400 – 800 Betten



Internistische Intensivmedizin,
> 800 Betten



Internistische Intensivmedizin:
Mittlerer Antimykotikaverbrauch in Tagesdosen pro 100 Pflegetage (RDD/100).

	<400 Betten		400-800 Betten		> 800 Betten	
	Median	Interquartil-bereich	Median	Interquartil-bereich	Median	Interquartil-bereich
Antimykotika gesamt	1,3	0,2 - 3,2	2,6	1,9 - 4,3	8,4	3,1 - 17,2
Amphotericin B gesamt	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,1	0,0 - 2,2
Amphotericin B konservativ	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Amphotericin B liposomal	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,1	0,0 - 2,2
Anidulafungin	0,0	0,0 - 0,1	0,0	0,0 - 0,1	0,0	0,0 - 1,1
Caspofungin	0,0	0,0 - 0,4	0,8	0,0 - 1,6	4,1	1,5 - 5,1
Fluconazol	1,0	0,5 - 2,3	0,9	0,5 - 1,3	2,0	0,4 - 3,9
Flucytosin	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Itraconazol	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Ketoconazol	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Micafungin	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,1
Posaconazol	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,1	0,0 - 0,6
Terbinafin	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Voriconazol	0,0	0,0 - 0,4	0,3	0,2 - 1,4	1,4	0,2 - 3,0

Andere nicht-operative Intensivmedizin,
< 400 Betten / 400 – 800 Betten / > 800 Betten



Andere nicht-operative Intensivmedizin:
Mittlerer Antimykotikaverbrauch in Tagesdosen pro 100 Pflegetage (RDD/100).

	<400 Betten		400-800 Betten		> 800 Betten	
	Median	Interquartil-bereich	Median	Interquartil-bereich	Median	Interquartil-bereich
Antimykotika gesamt	0,0	0,0 - 0,0	0,7	0,0 - 1,7	0,9	0,3 - 3,5
Amphotericin B gesamt	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,1
Amphotericin B konservativ	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Amphotericin B liposomal	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,1
Anidulafungin	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Caspofungin	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,1	0,1	0,0 - 0,4
Fluconazol	0,0	0,0 - 0,0	0,8	0,0 - 1,5	0,5	0,1 - 1,3
Flucytosin	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Itraconazol	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Ketoconazol	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Micafungin	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Posaconazol	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Terbinafin	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Voriconazol	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,1	0,1	0,0 - 0,4

Anästhesiologische und chirurgische Intensivmedizin, < 400 Betten



Anästhesiologische und chirurgische Intensivmedizin, 400 – 800 Betten



Anästhesiologische und chirurgische Intensivmedizin, > 800 Betten



Anästhesiologische und chirurgische Intensivmedizin:
Mittlerer Antimykotikaverbrauch in Tagesdosen pro 100 Pflegetage (RDD/100).

	<400 Betten		400-800 Betten		> 800 Betten	
	Median	Interquartil-bereich	Median	Interquartil-bereich	Median	Interquartil-bereich
Antimykotika gesamt	2,8	0,0 - 8,6	6,4	2,2 - 11,9	7,6	6,6 - 13,0
Amphotericin B gesamt	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,1	0,0 - 0,4
Amphotericin B konservativ	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,1
Amphotericin B liposomal	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,1
Anidulafungin	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,4	0,0	0,0 - 1,2
Caspofungin	0,0	0,0 - 1,9	1,7	0,7 - 5,1	1,9	1,1 - 3,0
Fluconazol	0,8	0,0 - 5,3	2,9	0,9 - 5,1	3,6	2,3 - 6,0
Flucytosin	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Itraconazol	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Ketoconazol	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Micafungin	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,1
Posaconazol	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Terbinafin	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Voriconazol	0,2	0,0 - 0,9	0,1	0,0 - 0,9	0,4	0,2 - 1,4

Andere operative / interdisziplinäre Intensivmedizin, < 400 Betten



Andere operative / interdisziplinäre Intensivmedizin, 400 – 800 Betten



Andere operative / interdisziplinäre Intensivmedizin, > 800 Betten



Andere operative/interdisziplinäre Intensivmedizin:
Mittlerer Antimykotikaverbrauch in Tagesdosen pro 100 Pflegetage (RDD/100).

	<400 Betten		400-800 Betten		> 800 Betten	
	Median	Interquartil-bereich	Median	Interquartil-bereich	Median	Interquartil-bereich
Antimykotika gesamt	3,7	2,0 - 6,2	4,6	3,2 - 7,1	8,5	0,6 - 14,4
Amphotericin B gesamt	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,2
Amphotericin B konservativ	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Amphotericin B liposomal	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,2
Anidulafungin	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,8	0,0	0,0 - 0,2
Caspofungin	0,4	0,0 - 2,5	1,3	0,6 - 4,5	0,9	0,0 - 4,4
Fluconazol	1,4	0,8 - 2,8	1,4	1,1 - 2,5	2,1	0,5 - 4,7
Flucytosin	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Itraconazol	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Ketoconazol	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Micafungin	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Posaconazol	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,1
Terbinafin	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0	0,0	0,0 - 0,0
Voriconazol	0,0	0,0 - 0,8	0,1	0,0 - 0,6	0,1	0,0 - 1,5